

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian terdapat korelasi antara kecukupan pakan secara kuantitatif dengan bobot badan Dombos cempes lepas sapih jantan memiliki tingkat korelasi sebesar 0,138, cempes lepas sapih betina sebesar 0,262, jantan pubertas sebesar 0,732 dan betina pubertas sebesar 0,147. Korelasi antara kecukupan pakan secara kuantitatif dengan PBBH pada cempes lepas sapih jantan sebesar 0,633, cempes lepas sapih betina sebesar 0,674, jantan pubertas sebesar 0,443 dan betina pubertas sebesar 0,355. Disimpulkan bahwa terdapat korelasi yang kuat antara kecukupan pakan dengan bobot badan Dombos jantan pubertas sebesar 0,732; kecukupan pakan dengan PBBH cempes lepas sapih jantan sebesar 0,633 dan cempes lepas sapih betina sebesar 0,674.

Saran

Usaha untuk mempertahankan kualitas pakan Dombos yang bagus, konsumsi pakan, serta kecukupan pakan yang baik. Peternak Dombos di Kabupaten Wonosobo disarankan untuk meningkatkan kualitas pakan yang diberikan kepada ternaknya. Faktor lingkungan, genetik dan manajemen pemeliharaan juga berpengaruh terhadap kondisi ternak, semakin baik pakan yang diberikan yang sesuai dengan kebutuhan bobot badannya maka semakin baik konsumsi dan kecukupan pakannya sehingga bobot badan ternak yang dihasilkan semakin baik.