

## SARAN

Biji kerandang yang digunakan untuk pakan unggas sebaiknya difermentasikan dulu dengan ragi tape selama 72 jam untuk meningkatkan kandungan nutrisinya sebelum digunakan untuk pakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Fardiaz, S. 2000. *Mikrobiologi Pangan 1*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Rahman, A. 1989. *Pengantar Teknologi Fermentasi*. Pusat Antar Universitas Pangan Dan Gizi, Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Subektiyoko, M. A. 2012. Pengaruh Berbagai Pengolahan Terhadap Kadar HCN dan Kandungan Nutrisi Biji Kerandang (*Canavalia virosa*). Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Yogyakarta.
- Suparjo. 2010. *Analisis Bahan Pakan Secara Kimiawi*. Laboratorium Makanan Ternak Fakultas Peternakan Universitas Jambi. Jambi.
- Umiyasih, U. dan Y.N. Anggraeny. 2008. Pengaruh Fermentasi *Saccharomyces cerevisiae* Terhadap Kandungan Nutrisi dan Kecernaan Ampas Pati Aren (*Arenga pinata* MERR.). Seminar Nasional Teknologi Peternakan dan Veteriner. Pasuruan.
- Winarti, E., Sarjiman, dan N. Cahyaningrum. 2011. Identifikasi, Produksi, dan Potensi Kerandang (*canavalia virosa*) Sebagai Sumber Pangan dan Pakan Alternatif. Buletin Plasma Nutfah Vol. 17 No.2. Yogyakarta.